

ציסטות צוואריות CERVICAL CYSTS

בסקירת המערכות שנערכה לך נמצאו ציסטה / ציסטות צוואריות בעובר.
ציסטות צוואריות הן הצטברויות נוזל קטנות הממוקמות בחלק הקדמי-צדדי של הצוואר ונגרמות
עקב עיכוב בהבשלת המערכת הלימפתית הצווארית וחיבורה למערכת הורידית בצוואר.
השכיחות בסקירות מוקדמות בהריון (שבועות 12-16) נעה בין 1.6% (ברונשטיין 1993) לבין
2.8% (אחירון 1995). לפי עבודתם של אחירון וחב', בכל המקרים בהם נצפו ציסטות צוואריות
כממצא בודד, לא היה קריוטיפ לא תקין, לא נצפו הפרעות מבניות אחרות בהמשך וכל הציסטות
נספגו ספונטנית בשבועות 16-20. כאשר הציסטות הצוואריות היו מלוות בשקיפות ערפית ≤ 4
מ"מ, ב - 25% היו הפרעות כרומוזומליות (תסמונת דאון ותסמונת טרנר).

המלצות:

כאשר נצפות ציסטות צוואריות כממצא יחיד בעת הסקירה המוקדמת, אין צורך בהמשך בירור.
כאשר הממצאים הציסטיים הנ"ל מלווים בשקיפות ערפית 4 מ"מ או יותר ו/או בסמנים רכים או
מבניים אחרים, מומלץ ייעוץ גנטי לבירור קריוטיפ וסקירה מורחבת ההריון.